Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder.

Herr v. Konakowicz, Hermannſtadt, Gasse zu den drei Eichen.

Karl Biasioli, Lehramtscandidat, Innsbruck, Innrain 16 III.

Wohnungsveränderung:

Herr C. F. Jickeli, wohnt jetzt Graz, Schiessstadtgasse 2.

Herr Dr. von Jhering, wohnt jetzt Taquara de Mundo nuovo Braſilien. (Briefe durch *Herr W. Deurer*, Hamburg, Zollenbrücke I.

Herr Dr. O. von Möllendorff ist nach China zurückgekehrt. Adresse: German Consulate General, Shanghai.

Für die Bibliothek eingegangen:

Riemenschneider, C., Beitrag zur Molluskenfauna des Harzes. — Vom Verfasser.

Neunzehnter, zwanzigster und einundzwanzigster Bericht über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde 1877—1880.

Annual Report of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College for 1879—80.

Lessona, Mario, Molluschi viventi del Piemonte. — Roma 1880. — Vom Verfasser.

Hesse, zur Kenntniss der Molluskenfauna Westfalens. — Vom Verfasser.

Journal of the Royal Microscopical Society. Vol. III. No. 1—5.

Anzeige.

M. M. Shepman in Rhoon bei Rotterdam wünscht Monographien der zweischaligen Mollusken von Reeve, Sowerby u. s. w. zu kaufen und bittet um Preisangabe.

Eine Sammlung europ. Binnenconchylien best. aus 560 Arten und 240 Var. in 1500 Nummern u. 4800 guten Exemplaren w. um 200 Mark verk. Verzeichniss zu haben bei F. Braun, Miesbach, Oberbayern.

Grössere Conchyliensammlung, schöne Exemplare und gut bestimmt zu verkaufen.

Näheres bei Wittwe Baumann,
München Mühlstr. 4$^1/_5$.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

No. 1. **TAUSCH-CATALOG** 1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Von den mit * bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2 Stücke geliefert, bei den Astarten eine kleine Suite.

		Mk.
Cypraea		
aurantium, Mart.	Tahiti	20—50
angustata, Gmel.	Austr.	2—3
capensis, Gray	Cap.	3—6
edentula, Sow.	„	2—3
exusta, Sow.	M. rubr.	15—20
leucostoma, Gask.	Mocca	20—25
pulchella, Sow.	China	6—12
pulchra, Gray	M. rubr.	20
pyriformis, Gray	Ceylon	20
Scottii, Brod.	Austr.	10—16
sulcidentata, Gray	„	20
tesselata, Sow.	N. Seel.	15—25
testudinaria, L.	Occ. ind.	2—4
„ var.	„	5
thersites Gray	Austr.	3—5
umbilicata, Sow.	„	20
Voluta		
flavicans, Gmel.	Guinea	10—20
fusiformis, Sow.	Austr.	10–16
marmorata, „	„	15—25
nivosa, Lam.	„	4—10
Norrisii, Sow.	„	3—6
Conus		
cedo nulli, L.	Ant.	10—30
dux, Hwass.	Phil.	20
incarnatus, Reeve	Malacca	5—6
Malaccanus, Brug.	„	20—30
pertusus, Brug.	Phil.	3—5
Victoriae, Reeve	Austr.	6
Neptunea		
decemcostata, Say	Na. Scot.	3—8
despecta, L.	Norw.	1—3
norvegica Chem.	c. o. Engl.	10—20
Turtoni, Bean.	Norw.	4—9
Buccinum		
finmarkianum, Verkr.	Norw.	0,50-1,50

		Mk.
fragile, Verkr.	„	0,50-3
Totteni, Stimps.	Na. Terr.	2—4
undatum L.	Nordsee	0,50-1
Astarte		
Von den mit * bezeichneten Arten wird eine kleine Suite von jung bis alt, 3—5 Stück geliefert. Der genaue Fundort wird auf den Etiquetten angegeben.		
*Banksii, Leach		0,80
(= compressa Montg. var?)		
*compressa, Montg.		0,80
*crebricostata Forbes.		1,50
elliptica, Brown		1
fusca, Poli		0,40
pulchella, Jonas		2
*semisulcata, Leach		1,20
(borealis autorum		
= arctica Gray)		
*sulcata, Da Costa		1
*triangularis, Montg.		0,80
*undata, Gould		1,50
Cardium		
Sämmtlich aus dem europäischen Faunengebiet; die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.		
aculeatum, L.		0,50-1
echinatum, L.		0,30-50
*edule L.		0,20
„ „ major		0,40
elegantulum, Möller		1
erinaceum, L.		1—2
*exiguum, Gmel.		0,60
*fasciatum, Montg.		0,50
groenlandicum, Chemn.		0,50-1,50
hians, Brocchi		6–10
islandicum, Chemn.		1—2
*minimum, Phil.		0,50
norvegianum, Spengl.		0,20-60

		Mk.
*nodosum, Turt.		0,50
oblongum, Chemn.		8,40 80
paucicostatum, Sow.		0,30-1
*papillosum, Poli		0,50
tuberculatum, L.		0,25-60
Helix		
Adolfi, Pfr.	Almeria	0,50
alonensis, Fér.	Valencia	0,30
*apennina, Mühlf.	It. mér.	0,30
*bathyomphala, Charp.	„	0,30
carthaginiensis, Ross.	Charth.	1
*cespitum, Drap.	Algier	0,40
codia, Bourg.	Algarve	2
*coelata, Stud.	Günzburg	0,40
*cretica, Fér.	Athen	0,30
*destituta, Charp.	Abruzzen	0,40
Dupotetiana, Forb.	Algier	0,30
figulina, Parr.	Graecia	0,30
gualteriana, L.	Almeria	0,50-1
ligata, Müll.	Ital.	0,30
*lens, Fér. var. lentiformis Zgl.	Graecia	0,50
lucorum, Müll.	Ital.	0,60
*Martensiana Tiberi	It. mer.	0,30
Pouzolzi, Payr.	Dalm.	0,60
Raspailii Payr.	Corsica	0,60
secernenda, Rossm.	Dalm.	0,50
*setipila, Ziegl.	Ital.	0,50
stiparum, Rossm.	Almeria	1,20

		Mk.
tetrazona, Jan.	Ital.	0,50
tristis, Pfr.	Corsica	0,50-1
tuberculosa, Conr.	Paläst.	0,40
Clausilia		
*blanda, Küst. *vera*	Dalm.	1
*cattaroensis, Ziegl.	„	0,40
*chia Bttg. var. samia Bttg.	Samos	0,60
*corynodes Held	Reichenhall	0,30
crassicostata, Ben.	Sicil.	1—2
*dalmatina, Partsch	Dalm.	0,40
*Grohmanniana, „	Palermo	0 60
Japonica, Crosse = nipponensis Kobelt	Japan	1,40
Josephinae, Bttg.	Salona	1
*Kephissiae, Roth	Attica	0,50
*laevissima, Zgl.	Dalm.	0,40
*lineolata, Held	Edolo	0,40
*macarana, Zgl.	Dalm.	0.40
*Menelaos v. Mart.	Taygetos	0,60
nobilis, Pfr.	Trapani	1
*orthostoma, Mke.	Günzburg	0,30
platydera, v. Mart.	Japan.	0,60
Rothi Zel. v. eustrophe, Bttg.	I. Skyatho	0,80
*sericata, Pfr. v. senex Bttg.	N. Euböa	0,60
*syracusana, Phil.	Syrac.	0,60
*tridens, Chemn.	Portorico	0,80

Bei Baarzahlung wird Rabatt gewährt:

Mitgliedern des Tauschvereins 10%, Nichtmitgliedern 5%.

Da es unmöglich ist, unsere Vorräthe auch nur annähernd zur Anzeige zu bringen, so erbitten wir Desideraten-Listen.

Die Herren Paläontologen machen wir besonders aufmerksam auf unser reiches Lager von Seeconchylien aus dem europäisch-arctischen Faunengebiete.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.

Briefe einfach an die „Linnaea“, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., Brönnerstr. 30.

No. 2. **TAUSCH-CATALOG** 1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Mitra		
cardinalis Lam.	Phil.	1—3
coccinea Reeve	„	16
isabella Swains.	China	5—10
regina „	„	6—10
vittata „	Molucc.	16
Cypraea		
annulus L.	Oc. ind.	0,10-30
arabica L.	„	0,15-50
arabicula Lam.	Columb.	0,50-80
argus L.	Oc. ind.	0,80-1,50
asellus L.	„	0,10-20
atomaria Gmel.	Maur.	0,40.50
caput serpentis L.	Oc. ind.	0,10.20
carneola L.	mar. aust.	0,15-50
caurica L.	Oc. ind.	0,15-30
cervinetta Kiener	Pacif.	0,50.1
cernica Sow.	Maur.	0,30-60
cinerea Gmel.	Oc. ind.	0,40-80
clandestina L.	„	0,10.20
cribraria L.	Maur.	0,40-60
erosa L.	Oc. ind.	0,10-25
errones L.	„	0,10.25
exanthema L.	Ind. occ.	0,60.1
felina Gmel.		0,20.40
gangrenosa Dillw.	Oc. ind.	0,20.40
helvola L.	„	0,10.20
hirundo L.	„	0,10.20
isabella L.	Maur.	0,10-30
Lamarkii Gray	Madag.	0,60-80
lurida L.	M. med.	0,20.60
lynx L.	Oc. ind.	0.15.30
mappa L.	„	1—3
mauritiana L.	Maur.	0,50-1,20
miliaris Gmel.	Japan	0,60-80
moneta L.	Oc. ind.	0,10-25
mus L.	Ind. occ.	0,50.1
neglecta Sow.	„	0,20.30
obvallata Lam.	Tahiti	0,20-60
ocellata L.	Ceylon	0,20-30
onyx L.	Oc. ind.	0,50-1,20
var. adusta Lam.	„	1
pantherina Sol.	M. rubr.	0,30.80
picta L.	Senegal	0,80-1,20
poraria L.	mar. austr.	0,10 30
punctulata Gray	Panama	0,30-50
pyrum Gmel.	M. med.	0,50-80
reticulata Mart.	Oc. ind.	0,20-80
var. histrio	„	0,30-60
scurra Chemn.	„	0,50-1,20
spurca L.	mar. med.	0,20-40
stercoraria L.	Afr. occ.	0,40-1
tigris L.	Oc. ind.	0,25-80
turdus Lam.	mar. rubr.	0,20.30
ursellus Gmel.	Oc. ind.	0,15-30
vitellus L.	„	0,15-40
Trivia		
annulata Gray	mar. austr.	0,50-1,20
australis Lam.	„	0,40-60
californica Gray	Calif.	0,20-30
candidula Gask.	Mexico	0,20-30
childreni Gray	Oc. ind.	0,30-60
cicercula L.	„	0,20-40
europaea Mtf.	M. med.	0,10-20
globulus L.	Oc. ind.	0,40-50
nivea Gray	Ind. occ.	0,20 30
nucleus L.	mar. austr.	0,15-40
oryza L.	Oc. ind.	0,10-15
pediculus L.	Cuba	0,10-20
pulex Sol.	mar. med.	0,10.20
pustulata Lam.	Panama	0,30.60
quadripunctata Gray	Ind. occ.	0,10-15
radians Lam.	Mexico	0,30-60
sanguinea Gray	Columb.	0,20-30
staphilea L.	Occ. ind.	0,10-30
var. limacina Lam.	„	0,10-20
suffusa Gray	Ind. occ.	0,10.15

Für Anfänger werden 50 Species Cypraea und Trivia in je 1—2 Expl. für den Preis von Netto Mark 10 geliefert.

		Mk.			Mk.
Chama			vitreus Chemn.		0,30-60
lazarus L.	Phil.	6—15	*Helix*		
Spondylus			abjecta Lowe	Madeira	0,30
americanus Lam.	Ind. occ.	4—16	arcta „	„	0,30
coccineus Lam.	„	6—9	armillata „	„	0,20
croceus Chemn.	Oc. ind.	5—10	attrita „	„	0,30
ducalis Chemn.	Phil.	5—12	advena Webb.	Capverd.	0,40
gaederopus L.	M. med.	1—4	Bulweri Wood	Mad.	0,60
imperialis Chemn.	China	2—6	calva Lowe	„	0,30
spathuliferus Lam.	Columb.	5—12	cheiranthicola Lowe	P. santo	0,40
Pecten			compacta „	„	0,30
Sämmtlich aus dem europäisch-arctischen Faunengebiet. Genaue Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.			dealbata „	„	0,30
			glasiana Sh.	Tenerifa	0,50
			lentiginosa Sow.	Mad	0,30
Bruëi Payr.		0,40-80	laciniosa „	„	0,40
flexuosus Poli		0,30-60	maderensis Wood	„	0,30
glaber L.		0,20-50	Michaudi Desh.	„	0,20
hyalinus Poli		0,30-60	nitidiuscula Sow.	P. santo	0,40
islandicus Müll.		0,50-2,50	obserrata Lowe	Mad.	0,30
Jacobaeus L.		0,50-2	paupercula „	P. santo	0,20
maximus L.		0,50-1	plicaria Fér.	Tener.	0,60
opercularis L.		0,20-60	pulvinata Lowe	P. santo	0,30
pes felis L.		1—3	punctulata Sow.	„	0,40
pes lutrae L.		0,20-1	rotula Lowe	Mad.	0,50
Philippii Recl.		2,50	spirorbis Desh.	„	0,20
pusio L. (Hinnites)		0,30-2	stephanophora Desh.	„	0,30
striatus Müll.		0,40-80	serta Albers	Capverd.	0,40
tenuicostatus Migh. et Ad.		1—5	tectiformis Lowe	P. santo	0,40
Testae Riv.		0,30-50	testudinalis „	„	0,60
tigrinus Müll.		0,30-60	tiarella Webb. subf.	Mad.	0,20
varius L.		0,20-1	turricula Lowe	„	0,50

Bei Baarzahlung wird Rabatt gewährt:
Mitgliedern des Tauschvereins 10%, Nichtmitgliedern 5%.

Wir theilen den geehrten Mitgliedern ergebenst mit, dass Herr Otto Goldfuss jetzt unserem Institute angehört und die Leitung der conchologischen Abtheilung übernommen hat. Die Revision unserer Sammlungen und Vorräthe wird von Zeit zu Zeit wiederholt, um Irrthümer zu vermeiden. Unsere ersten Autoritäten, wie Herr Dr. Böttger, S. Clessin, Prof. v. Martens haben dabei ihre Hülfe zugesagt.

Die „Linnaea" befindet sich jetzt vis-à-vis dem Senckenbergischen Museum, gr. Eschenheimerstrasse 45.

Gelder und Pospackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die **„Linnaea"**, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., gr. Eschenheimerstr. 45.

Kumpf & Reis in Frankfurt a.M.

No. 3. **TAUSCH-CATALOG** 1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Murex		
anguliferus Lam.	Senegal	3—5
foliatus Mart.	Amerr. occ.	3—5
monodon Sow. c. op.	Torresstr	10
rufus Lam.	Philipp.	2—4
rota Sow.	mar. rubr.	2—3
tenuispina Lam.	Philipp.	1—6
ternispina Lam.	„	2—4
Ficula		
ficoides Lam. (reticulata Reeve)	Ceylon	2—3
ficus L. (laevigata Reeve)	„	2—3
Dussumieri Val.	China	3—6
decussata Wood	Panama	1—4
reticulata Lam.	Sooloo-Ins.	1—3
Tudicla		
spirillus L.	Singap.	1—2
Conus		
aurantius Brug.	Molucc.	10—25
australis Chemn.	mar. austr.	2—3
gradatus Gray	Salanga	3 - 5
granulatus L.	Ind. occ.	6—20
Solandri Brod.	Philipp.	5—10
zebra Lam.	„	2—4
Cypraea		
arenosa Gray	Ind. occ.	0,30-80
cylindrica Born	Ceylon	1—2
fimbriata Gmel.	Oc. ind.	0,20-30
meleanostoma Leathes	mar. rubr.	0,50-2
quadrimaculata Gray	Oc. ind.	1—2
sanguinolenta Gmel.	Senegal	1—2
Sowerbyi Gray	„	1—3
stolida L.	Ceylon	1—3
tabescens Sol.	Oc ind.	0,50-1
talpa L.	„	0,20-1
variolaria Lam.	Maur.	0,50-1
ventriculus Lam.	Pacif. Oc.	0,50-1,50
Volutharpa Perryi Jay	Japan	12

	Mk.
Trochidea nach Weinkauffs Catalog aus dem europäischen Faunengebiet, genaue Fundorte auf den Etiquetten.	
Phasianella	
pullus L.	0,10-20
tenuis Mich.	0,10-20
speciosa v. Mühlf.	0,10-20
Turbo	
sanguineus L.	0,20-30
rugosus L.	0,50-1
Clanculus	
corallinus Gmel.	0,20-40
cruciatus L.	0,10-20
Juissieui Payr.	0,10-20
Trochus	
turbinatus Born.	0,20-30
articulatus Lam.	0,20-30
crassus Pult.	0,10-20
ziziphinus L.	0,20-60
conulus L.	0,20-50
Laugieri Payr.	0,10-30
granulatus Born	0,20-60
occidentalis Migh.	0,40-1
millegranus Phil.	0,20-50
exiguus Pult.	0,10-20
striatus L.	0,10-20
Richardi Payr.	0,20-40
umbilicaris L.	0,10-20
cinerarius L.	0,10-20
divaricatus L.	0,10-20
villicus Phil.	0,10-30
varius L.	0,10 30
tumidus Mtg.	0,30-50
adansoni Payr.	0,10-20
turbinoides Desh.	0,20.50
albidus Gmel.	0,20.60
Fermonii Payr.	0,10-30

		Mk.
magnus L.		0,20-1
fanulum Gmel.		0,20-50
Margarita		
bella Verkrüzen		1-1,50
cinerea Couth		0,20 50
groenlandica Chemn.		0,20 30
helicina Fabr.		0,20-30
obscura Couth.		0,20-50
varicosa Migh.		0,50-1
Leucochroa		
baetica Rossm.	Almeria	0 60
Boissieri Charp.	Palästina	0,50
candidissima Drap.	Marseille	0,10
var. major.	Algier	0,30
cariosula Mich.	„	0,30
Otthiana Forb.	„	0,30
Helix		
alabastrites Mich.	Algier	0,40
alpina Faur-Big.	hautes Alp.	0,40
angigyra Jan.	Italia	0,20
aperta Born	Cannes	0,30
banatica Partsch.	Transs.	0,80
candicans, Zglr.	Hungar.	0,20
cantiana Montg.	Mantua	0,20
caerulans, Mhlfd.	Croatia	0,30
carascalensis Fér.	Pyren.	0,40
chamaeleon Parr.	Carinth.	0,15
✓ cingulella Zglr.	Tatra	0,25
cingulata Stud,	Versna	0,20
var. colubrina Jan.	Tirol	0,20
cincta Müll.	Italia	0,25
cornea Drap.	Pyren.	0,20
cyclolabris Desh.	Graccia	0,30
cyrtolena Bourg.	„	1
desertorum Forsk	Cairo	0,15
„ var. inflata	Alexand.	0,20
faustina Zglr.	Transs.	0,25
globularis Zglr.	Sicil.	0,20
Gobanzi Frfldt.	Italia	0,20
Hermesiana Pini	„	0,20
Hoffmanni Partsch	Dalm.	1

		Mk.
ichthyomma Held	Reichenh.	0,25
instabilis Zglr.	Transs.	0,30
intermedia Fér.	Ulrichsb.	0,30
Lefeburiana Fer.	Illir.	0,15
lens. Fér.	Graecia	0,30
macrostoma Mhlfd.	Italia	0,30
Mazulli Jan.	Sicilien	0,40
melanostoma Drap.	Marseille	0,40
narentana Klec.	Dalm.	0,60
Paciniana Phil.	Sicilien	0,20
pellita Fér.	Rhodos	0,50
Preslii F. Schm.	Tirol	0,25
pyramidata Drap.	Hispan.	0,10
pyrenaica Drap.	Pyr. orient.	0,50
Schmidtii, Zglr.	Carniol.	0,25
setosa Zglr.	Dalm.	0,40
sphaeriostoma Bourg.	Graecia	0,40
strigata Müll.	Umbria	0,20
tigrina Jan.	It. sept.	0,20
umbilicaris Brum.	„	0,25
Ziegleri, F. Schm.	Carniol.	0,25
Cochlostyla		
Alberti Brod.	Philipp.	5—10
florida Sow.	„	2—4
monticola Sow.	„	3—6
regina Brod.	„	4—10
turbinoides Brod.	„	12—16
sarcinosa Fér.	„	15—18
smaragdina Reeve	„	5—8
Rhodea		
gigas Mouss.	N. Granada	5—6
Wallisiana Dohrn sine epid.	Peru	4—5
Balea		
elatior Spix	Brasilien	1—3
Clausilia		
aquila Parr.	Dalm.	0,30
asphaltina Zglr.	Carinth.	0,20
almissana Küst.	Dalm.	0,20
archilabris Kutsch.	Dalm.	0,20
affinis Phil.	Sicil.	0,20

		Mk.
albocincta Pfr.	Dalm.	0,20
Azesilaos v. Mart.	Graecia	0,30
agnata Partsch	Croat.	0,20
binotata Zglr.	Dalm.	0,15
bilabiata Wagn.	„	0,30
Boissieri Charp.	Syrien	0,30
brevior v. Mart.	Japan	0,80
byzantina Charp.	Creta	0,30
cruciata Stud.	Suec.	0,15
commutata Rossm.	Carn.	0,15
concilians A. Schm.	Transs.	0,20
crassilabris Küst.	Dalm.	0,20
cincta Brum.	Carinthia	0,15
cinerea Phil.	Sicilien	0,15
compressa Pfr.	Cerigo	0,20
conspurcata Jan.	Dalm.	0,10
corrugata Drp.	Graecia	0,30
cana Held	Transs.	0,20
deltostoma Lowe	Madeira	0,20
densestriata Zglr.	Carn.	0,15
decipiens Rossm.	Dalm.	0,15
exarata (Z.) Rossm.	„	0,15
elegans Bielz	Trans	0.20
fimbriata Mhlf.	Carn.	0,15
fallax Rossm.	Transs.	0,20
grisea Desh.	Graecia	0,15
glauca Bielz var. latens Friv.	Transs.	0,15
itala Mart. (var.)	Lombard.	0,15
interrupta Zglr. var. albina	Carn.	0,15
Kutschigi Küst.	Dalm.	0,30
livida Mke.	Transs.	0,15
lamellosa Wagn.	Dalm.	0,20
Lischkeana Parr.	Transs.	0,15
lunellaris Pfr.	Graec.	0,20
messenica v. Mart.	„	0,15
mucida Zglr.	Carinth.	0,15
naevosa Roth var. modesta Zglr.	Céfal.	0,20
ornata Zglr.	Croat.	0,15

		Mk.
piceata Zglr.	It. mér.	0,15
plumbea Rossm	Transs.	0,15
Pfeifferi Küst.	Dalm.	0,20
Pikermiana Roth	Böotia	0.20
pachygastris Zglr.	Dalm.	0,20
pachychila Zglr.	„	0,20
pachystoma Küst.	„	0,20
robusta Küst.	„	0,20
rugicollis Zglr.	Transs.	0,20
regalis Parr.	„	0,20
rugosa Drap.	Angl.	0,15
sutura Zglr.	Dalm.	0,20
succineata Zglr.	Carn.	0,15
straminicollis Parr.	Transs.	0,15
semirugata Zglr.	Dalm.	0,20
strigillata Mhlfd.	„	0,20
semilabiata Kutsch.	„	0,25
sulcosa Wagn.	„	0,20
Strobeli Porro	Ital.	0,15
turrita Pfr.	Graec.	0,20
thessalonica Friv.	„	0,30
vibex Rossm.	Croat.	0,20
vetusta Zglr.	Carn.	0,20
Voithi Rossm.	Graec.	0,30
varians Zglr.	Carn.	0,20

Pupa

Von den mit * bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2—3 Stück geliefert.

		Mk.
*anconostoma Lowe var. umbilicata	Madeira	0,25
*avenacea Brug.	Reichenh.	0,20
*antivertigo Drap.	Germ.	0,20
*angustior Jeffr.	Ital. mer.	0,20
*Bergomensis Charp.	Italia	0,20
Brauni Rossm.	Hisp.	1
Brondeli Bourg.	Algier	0,30
calathiscus Lowe	Madeira	0,30
concinna Lowe	Madeira	0,30
cylindrica Mich.	Pyren.	0,50
*costulata Nilss.	Suec.	0,25
californica Rowell	Calif.	0,25

		Mk.
cassida Lowe	Madeira	0,30
*claustralis Gredler	Austria	0,50
*cylindracea d. Cost.	Pyren.	0,20
doliolum Brug.(albin.)	Taunus	0,20
*var. scyphus Friv.	Böotia	0,20
*doliolum Drap.	Reichenh.	0,25
Farinesii Desm.	Pyren.	0,20
*frumentum Drap.	Germ.	0,20
*Ferrari Porro	Italia	0,25
ferraria Lowe	Madeira	0,30
granum Drap.	Gall.	0.20
*gularis Rossm.	Carinthia	0,25
irrigua Lowe	Madeira	0,30
Kokeili Rossm.	Carn.	0,25
lusitanica Rossm.	Portugal	0,30
laurinea Lowe	Madeira	0,30
*Mühlfeldti Küst.	Dalm.	0,20
*megachilos Jan.	Ital.	0,20
var. Bigorensis Charp.	Pyr. orient.	0,20
*minutissima Hartm.	Austr.	0,25
*muscorum L.	Germ.	0,15
var. aridula Held	Austr.	0,15
millegrana Lowe	Madeira	0,20
monticola Lowe	„	0,30
*Moulinsiana Drap.	Ital.	0,30
obtusa Drap.	Schneeb.	0,40
*pygmaea Drap.	Germ.	0,15

		Mk.
*pusilla Müll.	Austr.	0,20
*Philippii Cantr.	Graecia	0,20
pagodula Desm.	Gall.	0,20
pallida Phil.	Ital.	0,20
var. amicta Parr.		
polyodon Drap.	Pyr. orient.	0,20
pellucida Pfr.	St. Thomas	0,20
*quinquedentata Born	Eur. m.	0,20
Rhodia Roth	Graecia	0,20
ringens Mich.	Hisp.	0,30
Rossmaessleri Schm.	Carn.	0,30
*secale Drap.	Angl.	0,20
Sempronii Charp.	Suec.	0,20
saxicola Lowe	Madeira	0.30
*turritella West. (edentula Drap. var.)	Reichenh.	0,50
triplicata Stud.	Alp.	0,20
vincta Lowe	Madeira	0,30
*variabilis Drap.	Pyr. orient.	0,25

Strophia

		Mk.
mumiola	Cuba	0,30
mumia Brug.	Antillen	0,30
var. chrysalis Fér.	„	0,30-50
rubicunda Mke.	Cuba	0,40
striatella Fér.	Antillen	0,30
uva L.	„	0,10
iostoma Pfr.	Portorico	0,20

Bei Baarzahlungen wird Rabatt gewährt:
Mitgliedern des Tauschvereins 10%, Nichtmitgliedern 5%.

An seltenen Conchylien sind u. A. bei uns vorräthig: Carinaria vitrea Lam., Voluta aethiopica var. rufa, Latiaxis Mawae Grifft.

Lebende oder fossile Species der Gattungen Cancellaria, Turbinella und Strophia wünschen wir zu kaufen oder einzutauschen. Werke, die unserer Bibliothek fehlen, erwerben wir gleichfalls.

Wir sind damit beschäftigt, eine reiche Sammlung europäisch-arctischer Meeresconchylien aufzustellen. Der Preis richtet sich nach der Reichhaltigkeit der Suiten, die nach Uebereinkunft ausgewählt werden. Reflectanten ersuchen wir, sich baldigst mit uns hierüber in Verbindung zu setzen.

Gelder und Pospackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die „Linnaea“, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., gr. Eschenheimerstr. 45.

Kumpf & Reis in Frankfurt a.M.

No. 4. TAUSCH-CATALOG 1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Conus		
Aulicus L.	Oc. ind.	2—4
acuminatus Hw.	mar. rubr.	0,60-2
arenatus L.	„	0,20-60
bandanus Hw.	Philipp.	0,50-1,50
barbadensis Hw.	Ind. Occ.	0,50-1
betulinus L.	„	0,50-1,50
bullatus L.	Philipp.	3—5
californicus Hinds	Calif.	0,50-1
capitaneus L.	Phil.	0,20-1
daucus Hwass	Ind. occ.	1—2
distans „	Maur.	1-1,50
eburneus „	Ceylon	0,30-60
erythraeensis Beck	m. rubr.	0,30-60
figulinus L.	Oc. ind.	0.30-1
flavidus Lam.	Tahiti	0,30-80
generalis L.	Oc. ind.	0,50-1,20
geographus L.	„	0,50-1,50
glans Hw.	Maur.	0,50-80
glaucus L.	Oc. ind.	2—3
guinaicus Hw.	Guinea	1—2
imperialis L.	Oc. ind.	0,50-2
lineatus Chem	„	0,30-80
lithoglyphus Meusch.	Maur.	0,40-1
litteratus L.	Oc. ind.	0,80-1,50
lividus Hwass	„	0,30-60
magus L.	„	0,20-80
marmoreus L.	„	0,30-1
mediterraneus Hw.	m. med.	0,20-80
mercator L.	Ind. occ.	0,50-1,50
miles L.	Oc. ind.	0,30-1
millepunctatus L.	„	0,80-1,50
minimus L.	Maur.	0,30-60
miliaris Hwass	„	0,30-50
monile „	Oc. ind.	0,50-1,20
musicus „	„	0,40-50
nemocanus Hwass	Maur.	0,50-1,20
nocturnus „	Molucc.	2—5
nussatella L.	Phil.	0,40-1
obesus Hw.	Ceylon	0,50-2
obscurus Humphr.	Maur.	0,80-1,20
omaria Hw.	Oc. ind.	0,80-1,20
planorbis Born	„	0,50-1
princeps L.	Pacif.	3-8
pulicarius Hw.	Tahiti	0,40-80
quercinus „	Oc. ind.	0,40-1,20
rivularis Reeve	Molucc.	2—3
stercus muscarum L.	Oc. ind.	0,50-80
striatus L.	„	0,60-1,20
sulcatus Hwass	China	0,80-1,20
tahitensis Hw.	Tahiti	1-1,50
tendineus Hw.	Maur.	1—2
terebra Born	Maur.	0,50-1,50
tesselatus Born	mar. rubr.	0,40-80
textile L.	Oc. ind.	0,50-2
tulipa L.	Tahiti	0,80-1,50
verriculum Rve.	Maur.	0,50-1
vexillum Gmel.	Phil.	1-1,50
vitulinus Hw.	Oc. ind.	0,50-1,20
virgo L.	„	0,30-1
viridulus Lam.	Maur.	1—2

Für Anfänger werden 40 Species Conus für den Preis von netto 15 Mark geliefert.

		Mk.
Cyrtulus		
serotinus Hinds	Marquesas	2—4
distortus Gray	W. Col.	1-2,50
Northia		
serrata Dufresne	„	5—8
Ranella		
laevigata Reeve	„	1-1,50
Triton		
canaliferus Lam.	China	1-1,50
clandestinus „	Phil.	1—2
fusiformis Kiener		1—3
Pfeifferianus Rve.	China	3—4
rubecula L.	Maur.	0,20-40
granifera Lam.	„	0,20-40

		Mk.			Mk.
Fusus			*Mesalia* brevialis Lam.	Seneg.	1 – 3
alternatus Say	Ind. occ.	2,50	*Pupa* calpica West.	Hisp.	0,40
sulcatus Lam. c. op.	N. Seel.	4	„ Kobelti Hid.	„	0,50
inconstans Lischke	Japan	1-1,50	*Helix*		
Pterocera			ciliata Venetz	Tyrol	0,40
lambis L.	Oc. ind.	0,60-1,50	cinctella Dr.	Ital.	0,30
crocata Link	„	1—2	crenophila Pfr.	Euböa	0,30
(aurantia Lam.)			Codringtoni Gray	Graecia	0,80-1,20
scorpio L.	„	1—3	candiota Friv.	I. Milo	0,40
pseudoscorpio Lam.	„	1—6	chorismenostoma Bl.	Böot.	0,30-50
millepeda L.	„	2 – 5	(rupestris var.)		
multipes Chemn.	Maur.	5-7,50	dibothrion Friv.	Trans.	0,60
elongata Swains.	„	3—6	(bidens major)		
chiragra L.	Oc. ind.	1—3	fusca Montg.	Angl.	0,30-50
rugosa Sow.	„	1-2,50	gregaria Ziegl.	Sic.	0,40
Turitella			lamellata Jeffr.	Holst.	0,20
acutangula Desh.	Oc. ind.	0,50-1,50	limbata Drap.	Pyr.	0,40
Broderipiana d'Orb.	Peru	1 – 2	niciensis Fér.	Nizza	0,40
bicingulata Lam.	Senegal	0,40-1	olivieri Fér.	Euböa	0,30
bacillum Kiener	China	0,60-1,20	Rangiana Fér.	Pyr.	0,60
cingulata Sow.	Peru	0,30-40	spiriplana Oliv.	Palaest.	0,70
Cumingi Reeve	Panama	1-2,50	substriata Clessin	Krim	0,30-50
duplicata Lam.	Oc. ind.	1 – 2	Thiesseana Mouss.	Euböa	0,30
imbricata „	Ind. occ.	0,50-1	arcuata Zgl.	„	0,30
trisulcata „	mar. rubr.	0,50-1	—		
fuscata „	Senegal	0,50-1,20	Ghiesbreghti Nyst.	Mexico	3—5
terebra „	Oc. ind.	0,50-1,50	Cuminghami Gray	Austr.	4—6
zonata Dunker	Molucc.	0,30	Richmondiana Pfr.	„	6 – 10
communis Risso	Europa	0,10-20	angulata Fér.	Portorico	3—4

Sammlungen zu nachstehenden Netto-Preisen sind vorräthig:

100 Species europäischer Helix 1—3 Stück . . . . . Mark 15
50 „ „ Clausilia 2—5 „ . . . . . . „ 8
100 „ Seeconchylien aus dem europäischen Faunengebiet „ 25
200 „ „ „ „ „ „ „ 75
300 „ „ „ „ „ „ „ 200
(Wichtig für das Studium der Tertiärpetrefacten)
2000 Species Land- und See-Conchylien in 280 Gattungen und 5000 Exemplaren . . . . „ 750

Eine vorzüglich schöne Harpa-Sammlung enthaltend alle bekannten Arten (2 costata L., 3 rosea etc.) 80 Ex. . . . . Mark 150

Wir theilen hiedurch ergebenst mit, dass einer unserer ersten deutschen Conchyliologen eine Forschungsreise nach Brasilien unternommen hat. Die gesammte Ausbeute, soweit sie sich für Sammlungszwecke eignet, wird in unsere Hände gelangen.

Gelder und Pospackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die **„Linnaea“**, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., gr. Eschenheimerstr. 45.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 5. **TAUSCH-CATALOG** 1880.

TAUSCH-CATALOG

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Glandina		
Dominicensis Gmel.	Portorico	0,80-1,20
oleacina Fér.	Cuba	0,40-60
Philippiana Pfr.	Jamaica	1
rosea Gray.	Mexico	1,50-2,50
solidula Pfr.	Cuba	0,30-50
venusta Pfr.	Jamaica	0,80-1
Nanina		
Beckiana Pfr.	Philippinen	1
Busbyi Gray.	Neu-Seeland	4—6
Chenui Pfr.	Philippinen	1,50-2
Metcalfei Pfr. major.	„	1
Nouleti Guill.	Viti-Ins.	0,50-60
palaensis O. S.	Palaos-Ins.	0,20-30
regalis Bens.	Borneo	1,50-2
semigranosa Sow.	Philipp.	1,50-1,80
Zonites		
acies Partsch.	Dalmatien	0,20-30
albanicus Zglr.	„	0,30-50
algirus L.	Montpellier	0,30-50
carniolicus A. Schm.	Carniol.	0,30
compressus Zglr.	Croatien	0,20-30
verticillus Fér.	Oesterreich	0,10-20
— var. euboea Kob.	Graecia	0,20-30
Hyalinia		
arborea Say.	Ohio	0,20-30
caduca Say.	Mexico	0,80-1
Ferrea Morse.	Maine U. S.	0,20-30
gularis Say	Tennessee	0,20-30
Gundlachi Pfr.	St. Thomas	0,10-20
interna Say	Ohio	0,20-30
intertexta Binn.	Pensylvanien	0,30-40
labyrinthica Say	Ohio	0,10-20
ligera Say	„	0,30-40
limatula Ward	„	0,30
Helix		
aus Madeira etc. Forts. von No. 2.		
actinophora Lowe	Madeira	0,40

		Mk.
Bowdichiana Fér. subfoss.	Porto-Santo	1
compar Lowe	Madeira	0,50
consobrina Fér.	Teneriffa	0,60
consors Lowe	Madeira	0,50
— subfoss.	Porto-Santo	0,20
coronata Desh.	Madeira	0,30
delphinula Lowe	„	0,50-1
depauperata Lw.	Porto-Santo	0,50
— subfoss.	„	0,20
echinolata Lowe	„	0,30-40
erubescens Lowe	Madeira	0,50
fausta Lowe subfoss.	„	0,20-30
fluctuosa Lowe	„	0,30-40
leptosticta Lowe	„	0,40
leptostyla Dohrn.	Capverden	0,40
lurida Lwe. var. maj.	Madeira	0,40
Mac Andrewana Pfr. juv.	„	0,30-40
phlebofera Lw. = nivosa Sow.	„	0,50
— subfoss.	Porto-Santo	0,20-30
portosantana Sow.	„	0,80-1
tabellata Lowe	Madeira	0,40
Webbiana Lowe	„	0,40
atlassica Mouss.	Marocco	1-1,20
areolata Lowe (Pisanagruppe)	Oregon	1,20
corcyrensis Partsch	Walachei	0,30
crinita Sandr.	Dalmatien	1-1,20
diodonta Mühlf.	Banat.	0,40-50
dyrphica Blanc.	Euböa	0,60-80
inchoata Mor.	Portugal	0,60-80
insolida Zglr.	Dalmatien	0,30
limbata Drap.	Toulouse	0,40-50
ocellus Villa.	Ascoli-Piceno	0,20
oranensis Mor.	Oran	0,40
planata Chem.	Mogador	0,60-80
sphaerita Hartm.	Oran	0,30-40
subrostrata Fér.	St. Denis	0,40

		Mk.
Cochlostyla		
bullula Brod.	Philippinen	1,20
dinera Jonas = Jonasi Pfr. var.	„	2
dryas Brod.	„	0,80-1
dubiosa Pfr.	„	1,20
faunus Brod.	„	1,50-1,80
lignaria Pfr.	„	2-2,50
lazonica Sow.	„	1,20-1,50
mindoroensis Brod.	„	2
nimbosa Brod.	„	1,50
nympha Pfr.	„	1-1,20
opalina Sow.	„	2
pictor Brod.	Salomon-Ins.	2
Philippinensis Pfr.	Philipp.	1,50-2
sylvana Brod.	„	1-1,20
ticaonica Brod.	„	2-2,50
tricolor Brod.	Salomon. Ins.	1,50-2
ventricosa Brug	Philipp.	2,50
Woodiana Lam.	„	5
zebuensis Brod.	Ins. Zebu	1,50-2
Neritina für den angegebenen Preis werden 2—3 Stück geliefert.		
africana Parreys.	Nil	0,30-40
danubialis Zglr.	Donau	0,10-20
— var. carinata Kok.	Dalm.	0,10-20
fluviatilis L.	Algier	0,10-20
— var. halophila Klett.	Osts.	0,10.20
— vos. baetica Lam.	Murcia	0,20-30
— var. Prevostiana Partsch.	Wien	0,20-30
— var. Salonitana Lm.	Murc.	0.10-20
Jordani Butler.	Graecia	0,20-30
meridionalis Phil.	Sicilien	0,10-20
peloponesa Recl.	Lepante	0,20-30
strangulata v. Mhfld.	Carniola	0,10-20
transversalis Zglr.	Donau	0,10-20
valentina Graëlls	Valencia	0,30-40

		Mk.
Melanopsis		
acicularis Fér.	Oesterreich	0,10-20
costata Fér.	Ungarn	0,10-20
— var. jordanica Roth.	Jord.	0,20.30
cariosa L.	Spanien	0,10-20
Dufourei Fér. var. Graëllsi Fér.	Valencia	0,10-20
Esperi Fér.	Laibach	0,10-20
praerosa L	Graecia	0,10-20
Melania		
Holandri Fér. var. elegans Schm.	Carniolia	0,10
— var. crassa Kutsch.	Carinth.	0,10-20
tuberculata Müll.	Nil	0,20-30
Pyrgula		
annulata Mhfld.	Gardasee	0,20.30
Thiesseana Cles.	Messolonghi	0,30-40
Mitra		
adusta Lam.	Philippinen	1-1,20
ambigua Sw.	„	0,80-1,20
aureolata Sw.	Mauritius	0,30-40
crenifera Lam.	„	1
crocata Lam.	„	0,60-1
crenulata Lam.	Philippinen	0,60-80
ferruginea Lam.	Mauritius	1-1,20
filaris L.	„	0,40-80
fissurata Lam.	„	1-1,50
muriculata Lam.	„	0,50-60
nodosa Reeve	„	0,40-50
papalis L.	Ins. Annaa	3—5
pontificalis Lam.	Ceylon	0,40-1
Rüppelli Reeve.	Massaua	0,30-40
scabriuscula Lam.	Philippinen	0,60-80
sphaerulata Mart.	„	1,20-1,60
ticaonica Reeve.	„	0,50-60
tuberosa Lam.	„	0,40-60
vulpecula Lam.	„	1-1,20
zephyrina Duclos.	Mauritius	0,50-60

Bei Baarzahlung wird Rabatt gewährt, Mitgliedern des Tauschvereins 10 %, Nichtmitgliedern 5 %.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die „Linnaea“, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., gr. Eschenheimerstr. 45.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 6.

TAUSCH-CATALOG

1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Voluta		
Ellioti Sow.	Austral.	4—5
lapponica L.	Ceylon	2—3
mitraeformis Lam.	Austral.	5—6
Norrisi Sow.	„	3—4
rupestris Gmel.	China	2
undulata Lam.	Austral.	2—3
vexillum Chem.	Ceylon	3—5
Pleurotoma		
australis Roissy	China	1,50-2,50
babylonica Lam.	Philippinen	0,60-1,20
Garnonsi Reev.	Mauritius	0,80-1
grandis Gray	China	3—4
tigrina Lam.	Philippinen	0,60-80
tornata Dillw. (javana aut) ?		4—5
Strombus		
latissimus L.	Oc. ind.	8—10
Struthiolaria		
pes struthio-cameli Chem.	N.-Seel.	2,50-3,50
Spondylus		
aculeatus Chem.	Suez	2—3
variegatus Chem.	„	2—3
Limopsis		
multistriata Desh.	Suez	1
Aenigma		
naviformis Jon.	Oc. ind.	3—4
Crassatella		
decipiens Sow.	Philippinen	3—5
gibbosa Sow.	Amer. occ.	2—3
Periploma		
trapezoides Desh.	Bras.	2
Amphidesma		
scabra Hanl.	Philipp.	1,50-2
Testacella		
haliotidea Faure-Biguet	Brest.	0,40-50
Maugei Fér.	Portugal	0,60
Parmacella		
Deshayesi Moq.-Tand. (Schalen)	Algier	0,60

		Mk.
Vitrina		
elongata Drap.	Italien	0,20
major Fér.	Pyrmont	0,10-20
natalensis v. Mart.	Natal	0,50
guimarazensis Sow.	Philipp.	0,60
pellucida Müll.	Germ.	0,10-20
Helix		
aemula Rossm.	Tyrol	0,30
Ammonis A. Schm.	Italien	0,20
Arigonis Rossm.	Valencia	0,20-30
chalcidica Mouss.	Euboea	0,30-40
ciliata Venetz (var. major)	Marseill.	0,40
cobresiana v. Alt.	Carinthia	0,20
corrugata Gmel.	Sicilien	0,20-30
discrepans Tib.	Asc. Pic.	0,20-30
explanata Müll.	Algier	0,20
granulata Ald. (f. albina)	Engl.	0,20-30
hellenica Mouss.	Euboea	0,20-30
hispida L. var. concinna Jeffr.	Bonn	0,10
— var. major	Spanien	0,10-20
interpres West.	Euboea	1
lanuginosa Boissy var. roseotincta Forb.	Algier	0,20-30
leucozona Zgl.	Carniola	0,20
narentana Klec.	Dalmatien	0,50-60
neglecta Drap.	Asc. Pic.	0,20-30
ponentina Mor.	Coimbra	0,40-50
rufescens Penn.	Germ.	0,10-20
sericea Drp. (typus)	Schweiz	0,10-20
submarit. Bourg. (typus)	Alg.	0,20
— var.	Constantine	0,20
Terveri Mich. (Orginale)	Hyer. Ins.	1
triaria Friv.	Banat	0,20-30
Buliminus		
fasciolatus Oliv.	Rhodos	0,60
Hohenackeri Kryn.	Caucasus	0,60
niso Risso	Ragusa	0,10-20
Retowskianus Cless.	Krim	1-1,20
spoliatus Parr.	Graecia	0,20

		Mk.
Cylindrella		
alba, C. B. Adams.	Jamaica	0,30-40
camoënsis Pfr.	Cuba	0.20
brevis Pfr.	Jamaica	0,20-30
— var. obesa	„	0,30-40
cylindrus Chem.	„	0,30-40
— var. rosea	„	0,20-30
Chemnitziana Fér.	„	0,30-40
concreta Gdlch.	Cuba	0,40
elegans Pfr.	Jamaica	0,20-30
irrorata Gdlch.	Cuba	0,50-60
interrupta Gdlch.	„	0,40
pruinosa Mor.	„	0.80
perplicata Fér.	Guadeloupe	0,30-40
pallida Gdlch.	St. Thomas	0,30-40
porrecta Gdlch.	Cuba	0,20-30
Philippiana Pfr.	„	0,40-50
subula Fér.	Jamaica	0,30-40
sanguinea Pfr.	„	0,30-40
seminuda C. B. Adams	„	0,40
torquata Mor.	Cuba	0,40-60
variegata Pfr.	„	0,20-30
Weinlandi Pfr.	Haiti	0,50-60
Macroceramus		
claudens Gdlch.	Cuba	0,20-30
Gundlachi Pfr.	„	0,40
inermis Gdlch.	„	0,30
pupoides Pfr.	„	0,40
Zospeum		
alpestre Freyer	Carniolia	0,60
reticulatum Hauff	Carinthia	0,60
Schmidti Ffld.	Carniolia	0,60
Caecilianella		
acicula Müll.	Germ.	0,10-20
Bourguignati Benoit	Algier	0,30
Hohenwarti Rossm.	Italien	0,40-50
thamophila Bourg.	Algier	0,30
veneta Charp.	Trient	1-1,20
Cionella		
(Azeca) Menk. C. Pfr.	Detmold	0,60

		Mk.
Succinea		
campestris Say	Florida	0,20
levantina Desh.	Graecia	0,20-40
longiscata Mor. = elegans Riss.	Engl.	0,10-20
— var. debilis Mor.	Algier	0.10-20
modesta Gould.	Palaos	0,30
nuttalliana Lea	Californ.	0,30
obliqua Say	N.-Amer.	0,20
ovalis Gould	Illinois	0,30
striata Krss. var. limicola Morel.	Abyss.	0,20-30
Wardiana Lea = avara Say	Ohio	0,20
Lithoglyphus		
fuscus Pfr	Carniolia	0,10-20
prasinus Kok.	„	0,10-20
Amnicola		
für den angesetzten Preis werden mehrere Stücke geliefert.		
negropontina Cless	Graecia	0.20-30
seminula Charp.	„	0,20-30
vestita Ben.	Madonie	0,20-30
Somatogyrus		
isogonus Say	N.-Amer.	0,20
Assiminea		
californica Coop.	San Franc.	0,10-20
Paludinella		
gibba Drap.	Süd-Frankr.	0,10-20
Hydrobia		
für den angesetzten Preis werden mehrere Stücke geliefert.		
achaja Cless.	Graecia	0,20-30
consociella Ffld.	Dalm.	0,20-30
Eliae Palad	Bayonne	0,20-30
pictorum Palad	„	0,20-30
Thiessei Cless.	„	0,20-30
Bithynia		
marginata Bens.	Ceylon	0,10-20
Boissieri Charp.	Lepanto	0,10-20
Bythinella		
Parreysi Pfr.	Cuba	0,20-30

Bei Baarzahlung wird Rabatt gewährt, Mitgliedern des Tauschvereins 10 %, Nichtmitgliedern 5 %.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die **„Linnaea“**, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M , gr. Eschenheimerstr. 45.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M

No. 7. **TAUSCH-CATALOG** 1880.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Marginella		
die Exemplare sind alle lebend in der Bay von Gorée getrakt.		
Goodalli Sow.		18—22
„ var. rubicunda		22—30
pseudofaba Sow.		10–16
bifasciata Lam.		1,50-3
marginata Born (cincta Kien.)		1,50-2,50
harpaeformis Beck		1,50-2,50
faba L. var. minor.		1,50-2,50
Adansoni Kiener		1,50 2,50
Cleryi Petit		2
laeta Jousseaume		2
cornea Lam.		0,80-1
amygdala Kiener		0,50-0,80
persicola L.		0,20-0,30
„ var. major		0,40
capensis Krauss		0,20-0,30
triticea Lam.		0,10-0,20
cingulata Dillw. (lineata Lam.)		0,10
„ var. major		0,20-0,30
conoidalis	Cuba	0,20-0,30
curta Sow.	Peru	1-1,20
diaphana Kien.	Jnd. occ.	0,10-0,20
guttata Dillw.	Jamaica	0,20-0,30
interrupta Lam.	Puerto-Cab.	0,10
Jewetti Carpent.	Californien	0,10-0,20
pallida L.	Antillen	0,10-0,20
Philippinarum Redfield (avena Sowerby)	Zebu	0,20-0,30
prunum Gmel.	Westindien	0,30-0,40
quinqueplicata Lam.	Moluk.	0,50-1,50
Terveriana Petit	Dahlack	0,30
zonata Kien.	Cap	0,20-0,30
Turbinella		
capitellum L.	Oc. Ind.	0,80-1,20
ceramica L.	Philipp.	1,50-2,50
cornigera Lam.	Molukken	0,50-1,50
ovoidea Kiener	Ceylon	3—4

		Mk.
pyrum L.	Ceylon	1-2,50
rhinoceros Chem.	Sansibar	0,50-1,50
scolymus Lam.	S.-Amerk.	3—4
tuberculata Brod	Gallop.	2—3
tubifera Aut.	Philipp.	2
Lagena		
smaragdulus L.	Philipp.	0,50-1,50
Leucozonia		
cingulata Lam.	Panama	1-1,20
leucozonalis Lam.	W.-Ind.	1-1,50
nassa Gmel.	„	1—2
ocellata Gmel.	„	0,80-1,20
Plicatella		
Barclayi Reev.	Maur.	1,50-2,50
candelabrum Reev.	W.-Ind.	1,50-2,50
concentrica „	W.-Columb.	3—4
cerata Gray	Gallop.	1-2,50
craticulata Gmel.	Maurit.	0,50-1,50
carinifera Lam.	Oc. Ind.	1,50-2,50
crocea Gray	Sand. Ins.	0,60
despecta Adams	China	1
gibbula Gmel.	„	1,50-2
incarnata Desh.	Philipp.	0,80-1,20
infundibulum Gmel.	Martin.	1—2
lyrata Peas.	Marques	0,50-0,60
lauta Reev.	„	0,60-0,80
nodata Mart.	Austrl.	1-2,50
polygona Gmel.	Philipp.	1-1,50
turrita Gmel.	„	0,50-1
ustulata Reev.	Oc. Ind.	0,50-1
Peristernia		
Forskali Tapp.	Mar. rubr.	0,40 0,60
nassatnla Lam.	Philipp.	0,50-0,80
spinosa Mart.	Freundsch. Ins.	0,80-1
Harpa		
articularis Lam.	Philippinen	0,50-1,50
costata L. (imperialis Chem.)	Maurit.	10—25
conoidalis Lam.	„	1—3
minor Lam.	Oc. Ind.	0,20-0,80
„ var. crassa	„	0,50-0,60

		Mk.
nobilis Lam.	Philippinen	1—2
rosea Lam.	W.-Afric	3—20
ventricosa Lam.	Mauritius	0,50-2
Eburna		
australis Sow.	Austral.	4—5
areolata Lam.	Ceylon	1-1,50
spirata „	„	0,50-1,50
japonica Reev.	Jeddo	1-1,50
Monoceros		
acuminatum Sow.	S.-Amerk.	0,50-1,20
calcar Martyn	Cap Horn	1-2,50
crassilabrum Lam.	Chili	0,50-1,20
engonatum Conrad	Califor.	0,30-0,40
imbricatum Lam.	Cap Horn	1
lapilloides Conrad	Califor.	0,30-0,40
lugubre Sow.	„	0,50-1,80
Leptoconchus		
Lamarki Desh.	Maurit.	0,50-1
Robillardi „	„	0,50-1
striatus Rüppell	„	0,50-1.20
Magilus		
antiquus Lam.	Mauritius	1—3
„ var. microcephalus Sow.	Mauritius	1—3
Concholepas		
peruviana Lam.	Peru	0,50-2
Purpura		
Blainvillei Desh.	Chili	0,80-1,20
coronata Lam.	Senegal	1,20-1,50
persica Lam. c. op.	Maurit.	1-1,20
planospira Lam.	Gallopag.	2
vixilla Reev.	Philipp.	0.50 0.60
Solarium		
cingulum Kien.	Oc. Ind.	0, -0.80
cyclostoma Mke.	„	1,20-1,50
Chemnitzi Kien.	„	0,80-1
formosum Hinds	Philipp.	0,50-3
granulatum Lam.	Oc. Ind.	1—2
hybridum Lam.	Austral.	0,60-1
infundibuliforme Wd.	Oc. Ind.	0.80-1.20
luteum Lam.	Austral.	0,20-0.30
perspectivum L.	Philipp.	0,50-3
variegatum Lam.	Austral..	0.20-0,40

		Mk.
Haliotis		
asinina L.	Philipp.	0,20-0,50
bistriata Gmel.	Mozamb.	0,80-1,20
Cracherodi Leach	Califor.	0,60-1,50
diversicolor Reeve	Austral.	0,40 0,80
funebris Reeve	Mauritius	0,20-0,40
glabra Chem.	Austral.	0,40-0,50
iris Gmel.	„	1-1,50
naevosa Martyn	Neu-Seel.	1-1,50
parva L.	Ceylon	0,50-0,60
rufescens Sow.	„	1-2,50
splendens Reev.	Califor.	1—5
tuberculata L.	Mar. met.	0,20-0,60
varia L.	Philipp.	0,40-0,80
virginea Chem.	S.-Afr.	0,60 0,80
Turbo		
caelatus Chem. c. op.	Jamaic.	1—2
cornutus Gmel.	Philipp.	3—5
longispinus Lam.	Jamaica	1—2
Norrisi Sow.	Californ.	1—2
petholatus L.	Mauritius	0,80-1
radiatus Gmel. c. op.	Suez	1-1,20
setosus „	Maurit.	0,50-0,80
Helix		
alauda Fér.	Cuba	0,40-0,60
auricoma Fér.	„	0,80-1
„ var. minor	„	0,40-0,50
bifasciata Burrow	Bras.	0,40-0,50
bigonia Fér.	Philipp.	0,50-0,60
bipartita „	Percy-In.	2—3
„ var. minor	„	2,50
Bonplandi Lam.	Cuba	1
brasiliana Desh.	Bras.	2-2,50
Buffonia Pfr. = Humboldtiana Val. var.	Mex.	2—3
caeca Guppy	Frinidad	0,10-0.20
Caldwelli Bens.	Mauritius	0.20-0,40
carpenteriana Bland.	Florida	0,20-0,30
cepa Müll.	Haiti	3—4
circumfirmata Redf.	Berm.	0,20-0,30
cesticulus Gdlch.	Cuba	0.40 0,50
cubensis Pfr.	„	0,30-0,40
coluber Beck	Molluken	0,60 0,80
Craftoni Cox.	Austral.	1,20-1,80

		Mk.
Dennisoni Pfr.	Cuba	0,80
discolor Fér.	Cayenne	0,80
erinaceus Pfr.	Salom. Ins.	1-1,20
fallaciosa Fér.	Bengalen	0,30-0,40
Fraseri Gray	Austral.	1,50-2
fuscolabris C. B. Ads.	Jamaic.	2
Grayi Pfr.	Austral.	0,80-1
Grevillei Pfr.	Ceylon	3—4
griseola „	Mexico	0,20-0,30
hiligmoidea D'Orb.	Columb.	1,20-1,50
Hombroni Pfr.	Admir. In.	2
incerta Fér.	St. Thom.	0,40-0,50
incrustata Poey	Cuba	0,20
lanceolata Pfr.	Halmaheira	1-1,20
Lessoni Pfr.	Austr.	1-1,20
Listeri Gray	Philipp.	1
„ var. minor	„	0,60
loricata Gould.	Califor.	0,20-0,30
lucipeta Poey.	Cuba	0,20
marginata Müll.	Philipp.	0,50-0,60
monodonta Lea.	Haiti	0,40-0,50
Moricandi Sow.	Philipp.	0,60-0,80
multistriata Desh.	Cuba	0,30-0,40
muscarum Lea.	„	0,30-0,40
nemoralina Petit	St. Thom.	0,30-0,40
ovum reguli Lea.	Cuba	0,60-0,80
paraiana D'Orb.	„	0,80
peliomphala Pfr.	Japan	1,50
perplexa Fer.	Trinidad	0,80-1
planulata Lm.	Philipp.	1
„ var. minor	„	0,60
rota Brod. vera.	Philipp.	1,50
semicastanea Pfr.	Austr.	1—2
scrobiculata „	Philipp.	0,60-0,80
septemvolva Say.	Florida	0,20-0,30
sobrina Fér.	Cuba	2-2,50
Taranaki Gray	Austral.	0,30-0,40
turbiniformis Pfr.	Cuba	0,40
ungulina L.	Molukken	12—16
uvulifera Say.	Florida	0,20-0,30
versicolor Born	Cuba	0,40-0,50
vittata Müll.	Ceylon	0,50-0,60
xanthocheila Pfr.	Salom.-Ins.	3—4
zonaria L.	Molukken	0,60-0,80

Bulimus

		Mk.
Bronni Pfr.	Brasilien	2
coloratus Nyst	Venezuela	2
cantagallanus Benz.	Brasil.	3
eximius Albr.	Neu-Caled	6—8
„ var. elongatus	„	4,50
exesus Spix.	Brasilien	1,50-2
Hartwegi Pfr.	Ecuador	2,50
Lamarkianus Pfr.	Neu-Gran.	3
malleatus Say	Viti-Ins.	1,50-1,80
Pancheri Crosse	Neu-Caled.	1,50
pantagruelinus Desh.	Brasil.	3-3,50
pachychilus Pfr.	Chili	0,60-0,80
Seemanni Dohrn	Viti-Ins.	1,80
Shongi Lesson	Neu-Seel.	1.80
sexdentatus Spix.	Brasilien	2
Swainsoni Pfr.	„	1-2,50
speciosus Pfr.	Neu-Granad.	2
Taunaysi Fér.	Brasilien	1,50-2
Valenciennesi Pfr.	Neu-Gran.	4—5

Bulimulus

		Mk.
conspersus Sow.	Lima	0,30-0,40
derelictus Brod.	Bolivia	0,30-0,40
Dufresni Leach	Tasmann.	1,50-2
Lobbei Reeve	Peru	1,50-2
melo Quoy	Austral.	0,50-0,60
navicula Wagn.	Brasilien	1,50
Laurentii Sow.	Peru	0,20-0,30
pubescens Mor.	Brasilien	0,40,0,50
punctatus Ant.	Oc. Ind.	0,20-0,30
pseudosuccineus Mor.	Brasil.	0,60-1
Rhodostomus Gray	Austral	0,60-0,80
siamensis Pfr.	Cochinch.	0,40-0,50
Schiedeanus Pfr.	Mexico	0,30-0,40
scalariformis „	Peru	0,30-0,40
variegatus „	„	1-1,20
vexillum Wood.	„	0,30-0,40

Gibbulina

		Mk.
clavatula Lam.	Maurit.	0,30-0.40
fusus Lam.	„	0,50-0,60
„ var. gracilis	„	0,50-0,60
modiola Fér.	„	0,40-0,50
pagodus „	„	0,80-1

	Mk.
palangula Mor. Maurit.	0,40-0,50
sulcata Müll „	0,50-0,60
Ennea	
bicolor Hutton Ostind.	0,40
cerea Dunker Sansibar	0,60-0,80
obovata Pfr. Natal	0,60
Planti Pfr. „	1
Wahlbergi Krauss. „	0,60-0,80
Registoma	
ambiguum O. Semp. Luzon	0,10-0,20
fuscum Pfr. „	0,20-0,30
grande Gray Palaos-Ins.	0,20-0,30
Cyclostomus	
Belairi Petit. Madagascar	0,80-1,20
bicarinatus Sow. „	1-1,50
Cuvierianus Petit „	3—6
filosum Sow. „	1-1,50
filostriatus Sow. „	0,80-1,20
Barclayanus Pfr. Maurit.	0,60-1
madagascariensis Gray Mada.	1,20-2
tricarinatus Lam. Maurit.	1—2
zonulatus Petit Madagasc.	0,80-1,20
Clausilia	
aculus Bens. var. labio Grdl. China	1
Alschingeri Küst. var. magniventris Zara.	0,30-0,40
angustata Bielz Transsylv.	0,30
attica Parr. var. Pikermiana Graei.	0,20-0,30
Brusinae Kutsch. Obbrowazzo	0,60
bogatensis Bielz. Transsylv.	0,20-0,30
Bielzi Parr. „	0,20
bidentata Ström. var. septentrionalis A. S. Norweg.	0,10

	Mk.
carinthiaca A. Sch. Carinth.	0,30
costulata Jon. Italia	0,20-0,30
commutata Rossm.	
var. fusca d. Bett. „	0,10-0,20
„ granatina Zgl. Carnio.	0,10-0,20
„ ungulata „ „	0,10-0,20
canescens Parr. var. major Transs.	0,20
clandestina Rossm.	
„ var. Thiesseae Böttg. Graec.	0,60
dissipata Böttg. Rumelien	0,50
divergens Klec. Dalm.	0,30-0,40
dubia Dr. var. Sordellii. Ad. Bresc.	0,20
Duboisi Charp. Kaukas	0,60
formosa Zglr. Ragusa	0,20-0,30
foveicollis Parr. Kaukas.	0,80-1,20
Fussiana Bielz Transsylv.	0,20
grossa Rossm. Carniola	0,20-0,30
Helenae Klec. Ribaric	0,80-1
Kutschigi Küst. var. contracta Rossm. Dalm.	0,30
Klecaki Küst. Cattaro	1
Lopedusae Calc. Lamped.	0,20-0,30
maesta Fér. Palaestina	0,30-0,40
modesta var. interpicta Mous. Graei.	0,20-0,30
montana Stz. Transsylv.	0,20-0,30
patula Charp. Graec.	0,30
Regina Küst. Dalm.	0,20-0,30
somchetica Pfr.	
var. Raddei Siev. Kauk.	0,60
signana Kutsch. Dalm.	0,30-0,40
Schmidti Pfr. Corinth.	0,20-0,30

Bei **sofortiger** Baarzahlung wird Rabatt gewährt.
Mitgliedern des Tauschvereins 10 %, Nichtmitgliedern 5 %.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren.
Briefe einfach an die **„Linnaea“**, Naturhist. Institut
Frankfurt a. M., gr. Eschenheimerstr. 45.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.